

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 166
du 19 Mars 1990

VIGNE

Les températures restent très favorables au développement de la végétation et pour les cépages précoces, le stade E (feuilles étalées) est déjà atteint. Toutefois, la plus grande hétérogénéité règne au niveau du débourrement pour les autres cépages. En conséquence, le traitement **anti excoriose** doit être réalisé au fur et à mesure, lorsque les parcelles arrivent au stade D. Quelques acariens jaunes et thrips sont déjà visibles. Ils restent rares ; mais surveillez les parcelles habituellement atteintes. la population risque d'être précoce et abondante.

ARBRES FRUITIERS A NOYAU

**** acariens**

Les toutes premières larves d'acariens ont été observées sur pêcher et prunier. Dès maintenant, vous pouvez réaliser le traitement avec APOLLO ou CESAR sur les parcelles très atteintes.

NOTE I.N.R.A. - S.P.V

emploi des ovicides Apollo - 50 sc et César en 1990

: Situation

: Depuis deux ans, des tests "laboratoires" réalisés par le S.P.V. et l'I.N.R.A. sur des :
: oeufs d'hiver d'acariens rouges issus de vergers de pommiers ont permis de mettre en :
: évidence certains cas de résistance à APOLLO et CESAR en traduisant au verger par de :
: faibles persistances d'action.

: Dans certains cas, le phénomène est croisé entre les deux produits.

: La proportion de vergers concernés est pour l'instant nettement plus importante dans :
: le Sud-Est que dans les autres régions.

: Préconisation 1990

: Vergers où ces spécialités ont donné satisfaction en 1989

: Utilisation possible en 1000 en se limitant à un ovicide par an (APOLLO ou CESAR)

: Vergers où une baisse de persistance des ovicides a été observée en 1989

: Sans que puissent être mis en cause la qualité de pulvérisation et le stade d'inter-
: vention : Eviter de les employer en 1990

**** Pucerons sur pruniers**

Les premières colonies sont visibles . Un traitement est à réaliser sur les premiers foyers avec les spécialités FASTAC, DECIS, SUMI - ALPHA, KLARTAN, PIRIMOR,

:		:
:	- Respectez les abeilles pendant	:
:	la floraison, utilisez des spécialités	:
:	non toxiques pour elles !	:
:		:

MAIS

Les émergences de pyrales du maïs, se produisent depuis le 10 mars. N'attendez pas le dernier moment pour préparer les terres à maïs en vue des prochains semis.

AGRUMES

Le traitement d'hiver est toujours d'actualité . Réalisé à fort volume, avec un mélange d'insecticide et d'huile blanche, il est indispensable pour détruire de nombreuses cochenilles et acariens.

OLIVIERS

C'est le moment d'observer les dégâts commis sur feuilles par les teignes. Si plus de 10 % des feuilles sont atteintes, il est prudent d'effectuer un traitement à base de carbaryl ou dimethoate.

(C) SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1990 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.